

کتاب مرجع

بیولوژی کمپل

ویرایش دوازدهم - 2020

جلد دوم

لیزا یوری • مایکل کاین • استیون واسمن
پیتر مینورسکای • ربکا اور

مترجمین

شراره مستانی نژاد، مصطفی پویان
علی وفایی، محمد امین خرقانی
امیرحسین شاهسوند، علیرضا تنوری
حمیدرضا نبوی، ماهان پویان
مجید علی نوری

ویراستار علمی
مصطفی پویان

زیرنظر

دکتر سامان حسینخانی
استاد گروه زیست‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس




خانه زیست‌شناسی



کتب آموزشی پیشرو

عنوان و نام پدیدآور	کتاب مرجع بیولوژی کمپبل/لیزا یوری...[و دیگران]; مترجمین مصطفی پویان; زیر نظر سامان حسینخانی.
مشخصات شتر	تهران، کتب آموزشی پیشرو، ۱۴۰۰-
مشخصات ظاهری	ج: مصور (تیگی)؛ ۲۹×۲۳ س.م
شابک	۹۷۸-۹۴۱۳۸۶۲۲-۹۴۱۳۸-۸-۳: ۲. ج: ۹۷۸-۶۲۲-۹۴۱۳۸-۶-۹
وضعیت فهرست نویسی	فیبا
یادداشت	لیزا یوری، مایکل کاین، استیون واسمن، پیتر مینورسکای، ریکا اور.
یادداشت	مترجمین مصطفی پویان، شارهه مستانی نژاد، امیرحسین شاهسوند علی، فایی، محمدامین خراقانی، علیرضا توری، حمیدرضا نبوی، ماهان پویان، مجید علی نوری.
یادداشت	مترجمین جلد دوم مصطفی پویان، شارهه مستانی نژاد، علی وفایی، محمدامین خراقانی، مجید علی نوری، حمیدرضا نبوی، ماهان پویان، امیرحسین شاهسوند.
یادداشت	مترجمین جلد پنجم مصطفی پویان، شارهه مستانی نژاد، ساره زیدآبادی نژاد، مرضیه صالحی چهرمی...
یادداشت	Campbell biology, 12th ed, 2020 (چاپ اول: ۱۴۰۱ (فیبا))
یادداشت	ناشر جلد کتب آموزشی پیشرو می باشد.
موضوع	زیست شناسی Biology
شناسه افزوده	اری، لیزا
شناسه افزوده	Urrey,Lisa A
شناسه افزوده	پویان پنهن کلابی، مصطفی، ۱۳۵۱، مترجم، ویراستار
شناسه افزوده	حسینخانی، سامان، ۱۳۵۰-
ردہ بندی کرگہ	QH ۳۰۸/۲
ردہ بندی دیوبی	۵۷۰
شماره کتابشناسی ملی	۸۶۷۲۰۱۶
اطلاعات رکورد کتابشناسی	فیبا



کتاب مرجع

بیولوژی کمپبل

جلد دوم: سالم

نام کتاب : کتاب مرجع بیولوژی کمپبل (جلد دوم)

مؤلفین : لیزا یوری و همکاران

ترجمه : خانه زیست‌شناسی

ناشر : کتب آموزشی پیشرو (کاپ)

گروه ترجمه : شارهه مستانی نژاد، مصطفی پویان و همکاران

ویراستار علمی : مصطفی پویان

زیر نظر : دکتر سامان حسینخانی

ویرایش ادبی : مریم مجاور

طراح و گرافیست : سیما رائفی‌نیا- سپیده زارعی

نوبت چاپ : اول - ۱۴۰۲

لیتوگرافی، چاپ، صحافی : گلپاگرافیک / نگارنقش

شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۹۴۱۳۸-۸-۳

شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان



کتب آموزشی پیشرو

مرکز فروش: میدان انقلاب- خیابان فردوسی- رازی- خیابان وحدت‌النظری غربی- پلاک ۸۳

۰۹۱۶-۶۶۹۶۱۰۷۹ ۰۹۱۶-۶۶۹۵۳۵۱۷-۱۸ ۰۹۱۶-۶۶۹۶۱۴۷۲۳ ۰۹۱۶-۶۶۹۶۱۴۹۳۹۰

آدرس سایت زیرزمین: www.zirezarebinpub.ir صندوق پستی: ۱۳۰۴۵-۱۱۳۳۹**سایت نشر کاپ: www.cup-book.com**

پروفسور نیل کمپبل (Neil A.Campbell)

پروفسور نیل آ. کمپبل، نویسنده کتاب معروف "Biology" و محقق برجسته دانشگاه کالیفرنیا، در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۴ در بیمارستان "Redland" پس از تحمل رنج حاصل از نارسایی قلبی، درگذشت. وی در هنگام مرگ ۵۸ سال داشت. پروفسور کمپبل دکتراش را در شاخه علوم گیاهی و در سال ۱۹۷۵ از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرد. وی سپس در کالج Pomona، دانشگاه Cornell و نیز San Bernardino مشغول به تدریس شد تا اینکه در سال ۱۹۸۹ به گروه زیست‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا پیوست. وی در تمامی این دانشگاهها و دانشکده‌ها به عنوان متخصص در آموزش زیست‌شناسی مشغول به فعالیت بود.

دکتر جودی هالت، پروفسور و رئیس دپارتمان علوم گیاهی دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «دکتر کمپبل با بسیاری از دانشمندان و بزرگان زمان ما دوست بود. وی حامی سخاوتمندی برای کارکنان، دانشجویان و دپارتمان علوم گیاهی بود».



مهارت تألیف و ایثار و از خودگذشتگی دکتر کمپبل در آموزش زیست‌شناسی، بر معروفیت گروه زیست‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا افزود. دکتر کمپبل یقیناً به خاطر نوشتن کتاب‌های معروف Biology در سطح بین‌المللی مشهور است. به گفته پیرسون و بنجامین کامینگز، ناشران کتاب‌های کمپبل، از زمان معرفی کتاب Biology در سال ۱۹۸۷، در حدود ۷۰٪ زیست‌شناسان، پژوهشگران، بیوتکنولوژیست‌ها و در حدود ۱۰۰٪ از معلمان زیست‌شناسی زیر ۴۰ سال، کتاب Biology را به عنوان کتاب درسی خود انتخاب کرده‌اند. در بخش دانش‌آموزی نیز تخمین زده می‌شود که هر ساله بیش از نیم میلیون دانش‌آموز در سراسر جهان از کتاب Biology کمپبل استفاده کنند.

دکتر آنتونی هانگ، پروفسور زیست‌شناسی مولکولی و سلول گیاهی در دپارتمان زیست‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا، در مورد تأثیر پروفسور کمپبل بر

حوزه زیست‌شناسی و آموزش علوم زیستی می‌گوید:

«کتاب‌هاییش چنان معروفند که ماه گذشته، زمانی که برای شرکت در سمیناری در تایوان بودم، سه ویرایش چینی مختلف از کتاب‌هاییش را دیدم، هر

جا که می‌روم، وقتی می‌گوییم از کتاب‌های دانشگاه کالیفرنیا هستم، مردم از من می‌پرسند، آیا دکتر کمپبل را می‌شناسم؟»

کتاب‌های بیولوژی کمپبل تا کنون به بیش از ۹ زبان زنده دنیا ترجمه شده است. پس از مرگ دکتر کمپبل، از طرف خانواده‌اش درخواست می‌شود تا به جای اهدای تاج گل، هزینه‌اش را برای کمک به بودجه تحقیقاتی دانشجویانش، به حساب دانشگاه کالیفرنیا واریز کنند. در سال ۲۰۱۱ گروه مؤلفین کتاب Biology، به پاس سال‌ها خدمات ارزشمند نیل کمپبل در زمینه آموزش زیست‌شناسی، از ویرایش نهم، عنوان کتاب را به CAMPBELL BIOLOGY تغییر داده است.

روحش شاد و راهش پر رهو باد



- ۳۵ ریزرشته‌ها (رشته‌های اکتین)
- ۳۶ رشته‌های حدواسط

۶-۷ اجزای خارج سلولی و اتصالات بین سلول‌ها به هماهنگ نمودن فعالیت‌های سلولی کمک می‌کنند

- ۳۷ دیواره‌های سلولی گیاهان
- ۳۸ ماتریکس خارج سلولی در سلول‌های جانوری
- ۴۰ اتصالات بین سلولی
- ۴۰ پلاسمودسماتا در سلول‌های گیاهی
- ۴۰ اتصالات محکم، دسموزوم‌ها و اتصالات منفذدار در جانوران
- ۴۱ یک سلول بزرگ تراز مجموع اجزایش است



فصل ۷

ساختار و عملکرد غشا

۷-۱ غشاهای سلولی موزاییک سیالی از لیپیدها و پروتئین‌ها هستند

- ۴۹ سیال بودن غشا
- ۵۰ سیر تکاملی تنوع و گوناگونی در ترکیب لیپیدی غشا
- ۵۰ پروتئین‌های غشایی و عملکردهای آنها
- ۵۳ نقش کربوهیدرات‌های غشایی در شناسایی سلول - سلول
- ۵۳ ساخت و جهت‌گیری غشاها

۷-۲ ساختار غشا باعث ایجاد خاصیت نفوذپذیری انتخابی می‌شود

- ۵۴ تراوایی (نفوذپذیری) دولایه لیپیدی
- ۵۴ پروتئین‌های انتقال‌دهنده

۷-۳ انتقال غیرفعال، نوعی انتشار ماده از عرض غشا بدون صرف انرژی است

- ۵۵ اثرات اسمز در تعادل آب
- ۵۶ تعادل آب در سلول‌های بدون دیواره
- ۵۷ تعادل آب در سلول‌های دارای دیواره
- ۵۸ انتشار تسهیل شده: انتقال غیرفعالی که با کمک پروتئین‌ها صورت می‌گیرد

۷-۴ انتقال فعال با صرف انرژی، مواد حل شده را برخلاف شبکه غلظت


- ۶۰ جابه‌جا می‌کند
- ۶۰ انتقال فعال به انرژی نیاز دارد
- ۶۱ نگهداری پتانسیل غشا توسط پمپ‌های یونی
- ۶۳ انتقال همراه: انتقال همزمان به کمک یک پروتئین غشایی

۷-۵ انتقال توده‌ای مواد از عرض غشای پلاسمایی توسط اگزوسیتوz و

- ۶۳ اندوسیتوz انجام می‌گیرد
- ۶۴ اگزوسیتوz
- ۶۴ اندوسیتوz

فصل ۶

سفری به درون سلول



- ۶-۱** زیست‌شناسان برای بررسی سلول‌ها از میکروسکوپ و ابزارهای بیوشیمی استفاده می‌کنند
- ۸ کاربرد میکروسکوپ (میکروسکوپی)
- ۸ جزء‌به‌جزء کردن سلولی

- ۶-۲** سلول‌های یوکاریوتی دارای غشاهای داخلی هستند که مقایسه سلول‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی نگاهی دقیق‌تر به سلول یوکاریوتی
- ۱۲ به کمک این غشاهای اعمال‌شان را سازمان‌دهی می‌کنند
- ۱۲
- ۱۳

- ۶-۳** اطلاعات و دستورات ژنتیکی سلول‌های یوکاریوتی در هسته قرار دارند و به وسیله ریبوزوم‌ها به مرحله عمل در می‌آیند
- ۱۸ هسته: کتابخانه ژنتیکی سلول
- ۱۸ ریبوزوم‌ها: کارخانه‌های پروتئین‌سازی
- ۱۹

- ۶-۴** دستگاه غشایی درونی سلول‌ها، جابه‌جای پروتئین‌ها را تنظیم کرده و اعمال متابولیکی سلول‌ها را انجام می‌دهد
- ۲۱ شبکه آندوپلاسمی: کارخانه سنتز زیستی
- ۲۱ اعمال شبکه آندوپلاسمی صاف
- ۲۲ اعمال شبکه آندوپلاسمی زبر
- ۲۳ دستگاه گلزاری: مرکز ارسال و دریافت
- ۲۵ لیزوزوم‌ها: بخش‌های گوارش‌دهنده
- ۲۵ واکوئل‌ها: بخش‌های نگهدارنده و متنوع
- ۲۶ سیستم غشایی درونی: مرور

- ۶-۵** میتوکندری‌ها و کلروپلاست‌ها انرژی را از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می‌کنند
- ۲۷ منشأ تکاملی میتوکندری‌ها و کلروپلاست‌ها
- ۲۷ میتوکندری‌ها: تبدیل انرژی شیمیایی
- ۲۸ کلروپلاست‌ها: به دام انداختن انرژی نوری
- ۲۸ پراکسیزوم‌ها: اکسیداسیون
- ۳۰

- ۶-۶** اسکلت سلولی شامل شبکه‌ای از رشته‌هایی است که ساختارها و فعالیت‌های سلولی را سازماندهی می‌کند
- ۳۰ وظایف اسکلت سلولی: پشتیبانی و تحرک
- ۳۱ اجزای اسکلت سلولی
- ۳۲ ریزنولدها
- ۳۲ سانتریولوها و سانتریول‌ها
- ۳۳ مژک‌ها و تازک‌ها



فصل ۹

تنفس سلولی و تخمیر

9-۱ مسیرهای کاتابولیسمی با اکسید کردن مواد آلی، انرژی تولید می کنند

۹۸ مسیرهای کاتابولیک و ساخت ATP

۹۹ واکنش های ردوکس: اکسایش و کاهش اصل ردوکس

۱۰۰ اکسید شدن مولکول های سوختنی آلی در تنفس سلولی

۱۰۰ آزاد شدن تتریجی انرژی توسط NAD^+ و زنجیره انتقال الکترون

۱۰۲ مراحل تنفس سلولی: یک بررسی مقدماتی

9-۲ گلیکولیز با اکسید کردن گلوکز به پیرووات، انرژی شیمیایی تولید می کند

9-۳ پس از اینکه پیرووات اکسید شد، چرخه سیتریک اسید، اکسیداژیون

۱۰۵ انرژی زای مولکول های آلی را تکمیل می کند

۱۰۵ اکسیداژیون پیرووات به استیل کوانزیم A

۱۰۶ چرخه سیتریک اسید

9-۴ طی فسفریلاژیون اکسیداژیو، فرایند شیمیواسمز، انتقال الکترون را با

۱۰۸ ساخت ATP همراه می کند

۱۰۸ مسیر انتقال الکترون

۱۰۹ شیمیواسمز: مکانیسم جفت شدن انرژی

۱۱۲ اندازه گیری میزان تولید ATP در تنفس سلولی

9-۵ تخمیر و تنفس بی هوازی، سلول ها را قادر می سازند تا بدون استفاده از

۱۱۴ اکسیژن ATP بسازند

۱۱۵ انواع تخمیر

۱۱۶ مقایسه تخمیر با تنفس هوازی و بی هوازی

۱۱۷ اهمیت تکاملی گلیکولیز

9-۶ گلیکولیز و چرخه سیتریک اسید با بسیاری از مسیرهای متابولیسمی

۱۱۸ دیگر ارتباط دارند

۱۱۸ گوناگونی در کاتابولیسم

۱۱۹ بیوسنتر (مسیرهای آنابولیکی)

۱۱۹ تنظیم تنفس سلولی از راه سازو کارهای خودتنظیمی

فصل ۱۰

فتوسنترز

10-۱ فرآیندی که غذای زیست کرده را فراهم می کند

10-۲ فتوسنترز، انرژی نور را به انرژی شیمیایی ذخیره شده در غذاها تبدیل می کند

فصل ۸

مقدمه‌ای بر متابولیسم



8-۱

است

متابولیسم جانداران، تغییر ماده و انرژی، برطبق قوانین ترمودینامیک

۷۰

سازمان دهی شیمی حیات در مسیرهای متابولیکی

۷۰

انواع انرژی

قوانين تبدیل انرژی

قانون اول ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک

نظم و بی‌نظمی زیستی

8-۲

می دهد

تغییر انرژی آزاد یک واکنش، از خودبه خودی بودن انجام آن خبر

۷۴

انرژی آزاد، ΔG

انرژی آزاد، پابداری و تعادل

انرژی آزاد و متابولیسم

واکنش های انرژیزا و انرژی خواه در متابولیسم

تعادل و متابولیسم

8-۳

انجام کار سلولی می شود

ATP با همراه کردن واکنش های انرژیزا با واکنش های انرژی خواه باعث

۷۸

ساختار و هیدرولیز ATP

چگونه هیدرولیز ATP کار انجام می دهد

8-۴

افزایش می دهنده

آنژیمها با کم کردن سدهای انرژی، سرعت واکنش های متابولیسمی را

۸۱

سد انرژی فعال سازی

چگونگی افزایش سرعت واکنش ها توسط آنژیمها

اختصاصی بودن سوبسترای آنژیمها

کاتالیز در جایگاه فعال آنژیم

اثرات شرایط موضعی بر فعالیت آنژیم

pH و

کوفاکتورها

مهار کننده های آنژیمها

تکامل آنژیمها

8-۵

تنظیم فعالیت آنژیمی به کنترل متابولیسم کمک می کند

تنظیم آلوسترنیک آنژیمها

فعال سازی و مهار آلوسترنیکی

مهار بازخودی (خودتنظیمی)

جایابی اختصاصی آنژیمها در سلول



۱۶۶	مسیرهای تبدیل و انتقال پیام
۱۶۷	فسفریله شدن و دیفسفریله شدن پروتئین
۱۶۷	مولکولهای کوچک و بونها به عنوان پیکهای دومین
۱۶۸	AMP
۱۶۹	یونهای کلسیم و اینوزیتول تریپسفات (3IP)

11-4 پاسخ: پیامرسانی سلولی به تنظیم فعالیتهای سیتوپلاسمی یا رونویسی می‌انجامد

۱۷۱	پاسخهای سیتوپلاسمی و هسته‌ای
۱۷۲	تنظیم دقیق پاسخ
۱۷۲	تشدید پیام
۱۷۲	اختصاصی بودن پیامرسانی سلولی و هماهنگی پاسخ
۱۷۳	کارآیی پیامرسانی: پروتئین‌های داربست و مجموعه‌های پیامرسانی
۱۷۴	پایان پیام

۱۷۵	آپوپتوز، چندین مسیر پیامرسانی سلولی را تلفیق می‌کند
۱۷۶	آپوپتوز در کرم سینورا بدیتیس الگانس
۱۷۶	مسیرهای آپوپتوزی و پیام‌های فعلی کننده آنها



فصل ۱۲ چرخه سلولی

۱۸۲	اغلب تقسیم سلولی، سلول‌های دختری را به وجود می‌آورد که از نظر ژنتیکی یکسان هستند.
-----	---

۱۸۲	نقش‌های اساسی تقسیم سلولی
۱۸۲	سازماندهی سلولی مواد ژنتیکی
۱۸۳	توزیع کروموزوم‌ها در طی تقسیم سلولی یوکاریوتی

۱۸۴	مراحل میتوز و اینترفاز، چرخه سلولی را تشکیل می‌دهند
۱۸۴	مراحل چرخه سلولی

۱۸۵	دوك میتوزی: نگاهی دقیق‌تر
۱۸۹	سیتوکینز: نگاهی دقیق‌تر
۱۹۰	تقسیم دوتایی در باکتری‌ها
۱۹۲	تمامی میتوز

۱۹۳	چرخه سلولی یوکاریوتی بوسیله یک دستگاه کنترل مولکولی، تنظیم می‌شود
-----	---

۱۹۴	سیستم کنترل چرخه سلولی
۱۹۵	ساعت چرخه سلولی: سایکلین‌ها و کینازهای وابسته به سایکلین
۱۹۶	نشانه‌های توقف و پیش‌برنده: سیگنال‌های درونی و بیرونی نقاط وارسی
۱۹۸	نبود کنترل‌های چرخه سلولی در سلول‌های سرطانی

۱۲۷	کلروپلاست‌ها: جایگاه فتوسنتر در گیاهان
۱۲۸	ردیابی اتم‌ها در فتوسنتر: تحقیق علمی
۱۲۸	تجزیه آب
۱۲۹	دو مرحله فتوسنتر: نگاه کلی

10-3	واکنش‌های نوری، انرژی نور خورشید را به انرژی شیمیایی ذخیره‌شده در ATP و NADPH تبدیل می‌کند
------	--

۱۳۱	ماهیت نور
۱۳۱	رنگیزهای فتوسنتری: گیرنده‌های نور برانگیختگی کلروفیل توسط نور
۱۳۲	فتوسیستم: کمپلکس مرکز واکنش که با کمپلکس‌های دریافت‌کننده نور همراه است
۱۳۴	جریان خطی الکترون
۱۳۵	جریان چرخه‌ای الکترون
۱۳۹	مقایسه شیمیواسمز در کلروپلاست‌ها و میتوکندری‌ها

10-4	چرخه کالوین از ATP و NADPH، برای تبدیل CO_2 به قند استفاده می‌کند
------	--

۱۴۱	در شرایط آب و هوایی گرم و خشک، مکانیسم‌های جایگزینی برای تثبیت کربن تکامل یافته‌اند
۱۴۳	آیا تنفس نوری یک ردپای تکاملی است؟
۱۴۴	گیاهان C_4
۱۴۷	گیاهان CAM

10-5	فتوسنتر برای زندگی روی زمین ضروری است
------	---------------------------------------

11-1	پیام‌های بیرونی به پاسخ‌هایی درون‌سلولی تبدیل می‌شوند
156	تمامی پیامرسانی سلولی
156	پیامرسانی موضعی و از راه دور
158	سه مرحله پیامرسانی سلولی: مروری کلی

11-2	دربافت: یک مولکول پیامرسان به یک پروتئین گیرنده متصل و موجب تغییر شکل آن می‌شود
161	گیرنده‌ها در غشای پلاسمایی
161	گیرنده‌های درون‌سلولی

11-3	تبدیل و انتقال: آبشارهایی از میانکننشهای مولکولی، پیام‌ها را از گیرنده‌ها تا مولکول‌های هدف در سلول، تقویت می‌کنند
------	--



6 A Tour of the Cell

سفری به درون سلول



▲ شکل ۱-۶ سلول، اساس ساختاری و عملکردی موجودات زنده است. تصویر بالا مربوط به پارامسی است که یک جاندار تکسلولی محسوب می‌شود. بسیاری از انواع حیات، به شکل موجودات زنده تکسلولی وجود دارند. موجودات زنده بزرگ‌تر و پیچیده‌تر مانند گیاهان و جانوران، پرسلولی هستند. در این فصل، عمدتاً بر سلول‌های یوکاریوتی (سلول‌هایی را که دارای هسته مشخص هستند) تمرکز می‌کنیم.

سازمان دهی داخلی در سلول‌های یوکاریوتی، چگونه امکان انجام عملکردهای حیاتی سلول را فراهم می‌سازد؟

تغییر شکل ماده و انرژی

- * سیستمی از غشاهای درونی، پروتئین‌ها، لیپیدهای و کربوهیدرات‌ها را سنتز کرده و آنها را تغییر می‌دهند.

- * کلروپلاست‌ها انرژی نوری را به انرژی شیمیایی تبدیل می‌کنند.

- * میتوکندری‌ها با تجزیه مولکول‌ها، ATP تولید می‌کنند.

برهمکنش با محیط

- * ورود مواد به سلول و نیز خروج آنها از سلول، توسط غشای پلاسمایی کنترل می‌شود.
- * سلول‌های گیاهی، دیواره سلولی محافظ دارند.

ذخیره و انتقال اطلاعات ژنتیکی

- * DNA موجود در هسته حاوی دستور العمل ساخت پروتئین‌هاست.

- * ریبوزوم‌ها، مکان‌های سنتز پروتئین هستند.


ریبوزوم

پروتئین

روش مطالعه

یک سلول جانوری و یک سلول گیاهی رسم کنید: طرح یک سلول جانوری را رسم نموده و سپس ساختارها، نامها و عملکردهایشان را اضافه کنید. سپس همین کار را برای یک سلول گیاهی نیز تکرار کنید.


غشای پلاسمایی:
سدی با نفوذ پذیری انتخابی



میکروسکوپ نوری نمی‌تواند جزئیات ریزتر از $\frac{1}{2}$ میکرومتر (μm) یا ۲۰۰ نانومتر (nm) را صرفنظر از میزان بزرگنمایی نشان دهد (شکل ۶-۲). پارامتر سوم (کنتراست)، تفاوت وضوح در بخش‌های روشن و تیره یک تصویر است. روش‌های افزایش کنتراست شامل رنگ‌آمیزی و نام‌گذاری اجزای سلول هستند که موجب دیده شدن آنها می‌شوند. شکل ۶-۳ انواع مختلف میکروسکوپی را نشان می‌دهد. در طول مطالعه این بخش به این شکل توجه کنید. زیست‌شناسان سلولی به دلیل عدم وجود قدرت تفکیک بالا، قادر به استفاده از میکروسکوپ‌های نوری معمولی برای مطالعه اندامک‌ها نبودند. (اندامک‌ها ساختارهای دارای غشا هستند که در سلول‌های یوکاریوتی وجود دارند). برای مشاهده این ساختارها و جزئیات آنها نیاز به توسعه ابزار جدیدی بود. در سال ۱۹۵۰، میکروسکوپ الکترونی به زیست‌شناسی معرفی شد.

▼ شکل ۶-۴ محدوده اندازه سلول‌ها. اکثر سلول‌ها دارای قطری بین ۱ تا ۱۰۰ میکرومتر هستند و بنابراین تنها به وسیله میکروسکوپ دیده می‌شوند. توجه داشته باشید که مقیاس سمت چپ شکل، لگاریتمی است تا با محدوده اندازه‌های نشان‌داده شده تطابق داشته باشد. مقیاس با ۱۰ متر شروع می‌شود و پائین می‌آید، هر مقیاس اندازه‌گیری منبع، کاهش ده برابری را نشان می‌دهد در ضخامت و یا طول. برای مشاهده سیستم اندازه‌گیری کامل، ضمیمه C را نگاه کنید.

For a complete table of the metric system, see the back of the book.



1 centimeter (cm) = 10^{-2} meter (m) = 0.4 inch
 1 millimeter (mm) = 10^{-3} m
 1 micrometer (μm) = 10^{-6} m = 10^{-3} mm
 1 nanometer (nm) = 10^{-9} m

مبحث ۶-۱

زمیست‌شناسان برای بررسی سلول‌ها از میکروسکوپ و ابزارهای بیوشیمی استفاده می‌کنند

چگونه زیست‌شناسان سلولی اعمال درونی این اجزای ریز و زنده را بررسی می‌کنند؟ قبل از اینکه سفری به درون سلول داشته باشیم، اطلاع از چگونگی بررسی سلول‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد.

کاربرد میکروسکوپ (میکروسکوپی)

پیشرفت علوم به موازات ابداع وسایلی است که حواس انسان را تقویت می‌کنند. کشف و مطالعه اولیه سلول‌ها با ابداع میکروسکوپ در سال ۱۵۹۰ و اصلاح آن در قرن ۱۷ آغاز شد. رابت هوک در سال ۱۶۵۵، زمانی که با میکروسکوپ سلول‌های مرده پوست درخت بلوط را مشاهده می‌کرد، برای اولین بار دیواره سلولی را دید. اما برای مشاهده سلول‌های زنده، عدسی‌هایی که آنتونی ون لیون هوک به طرز شگفت‌آوری ساخته بود، مورد نیاز بود. هیجان هوک زمانی که در سال ۱۶۷۴ ون لیون هوک را ملاقات کرد و جهان میکرو ارگانیسم‌ها - که هوک آنها را جانوران بسیار کوچک ذره‌بینی می‌نامید - برایش آشکار شد، قابل تصور نیست.

میکروسکوپ‌هایی که در ابتدا به وسیله دانشمندان دوره رنسانس استفاده می‌شدند، درست همانند میکروسکوپ‌هایی هستند که شما احتمالاً در آزمایشگاه استفاده می‌کنید، یعنی از نوع میکروسکوپ‌های نوری (LM) بودند. نور مرئی از نمونه عبور کرده و نهایتاً به عدسی‌های شیشه‌ای می‌رسد. عدسی‌ها نور را به گونه‌ای منعکس می‌کنند (می‌شکنند) که تصویری بزرگ‌شده از نمونه به چشم می‌رسد.


سه پارامتر مهم در کاربرد میکروسکوپ، بزرگنمایی، قدرت تفکیک و کنتراست هستند. بزرگنمایی در میکروسکوپی به نسبت اندازه تصویر نمونه، به اندازه واقعی آن اطلاق می‌شود. میکروسکوپ‌های نوری می‌توانند یک نمونه را حدود ۱۰۰۰ برابر اندازه واقعی آن بزرگ کنند. هرچه بزرگنمایی بیشتر شود، تصویر، تیره، تار و مبهمن‌تر می‌شود. قدرت تفکیک، میزان وضوح و شفافیت تصویر است؛ به عبارتی کمترین فاصله بین دو نقطه است به گونه‌ای که به صورت دو نقطه مجزا تشخیص داده شوند. برای مثال، آنچه که به عنوان یک ستاره در آسمان به وسیله چشم غیرمسلح دیده می‌شود شاید به کمک تلسکوپ به صورت دو ستاره در کنار یکدیگر مشاهده گردد. به طور مشابه،

زیستی کوچک‌تر از ۲ نانومتر قابل استفاده نیستند. با این وجود، این قدرت تفکیک هنوز ۱۰۰ برابر میکروسکوپ‌های نوری است. میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) برای مطالعه جزئیات سطح نمونه مفید است (شکل ۳-۶). پرتو الکترونی، سطح نمونه را که معمولاً به وسیله لایه نازکی از طلا پوشیده شده است پوییش (اسکن) می‌کند.

در میکروسکوپ الکترونی (EM) به جای نور، پرتوی از الکترون‌ها بر نمونه و یا سطح آن تابیده می‌شود. قدرت تفکیک به صورت معکوس به طول موج پرتو به کار رفته در میکروسکوپ وابسته است. پرتوهای الکترونی دارای طول موج‌های کوتاه‌تر از نور مرئی هستند. با اینکه میکروسکوپ‌های الکترونی جدید دارای قدرت تفکیک ۲۰۰ نانومتر هستند، اما عمل‌آبرای ساختارهای

▼ شکل ۳-۶ بررسی میکروسکوپی

میکروسکوپ نوری (LM)






زمینه‌روشن نور به طور مستقیم از نمونه می‌گذرد. تصویر،
کنترast کمی دارد (چپ)

رنگ‌آمیزی با رنگ‌های مختلف (راست)، کنترast را
افزایش می‌دهد. بیشتر روش‌های رنگ‌آمیزی نیاز دارند
که سلول تثبیت شده باشد، بنابراین سلول را می‌کشند.

فاز کنترast. با تقویت تغییرات در چگالی نمونه،
کنترast را در نمونه رنگ‌آمیزی نشده افزایش می‌دهد.
مخصوصاً برای مطالعه سلول‌های رنگ‌آمیزی نشده و زنده
مفید است.

کنترast افتراقی - تداخلی (نومارسکی). شبیه
میکروسکوپ فاز کنترast، از تغییرات اپتیکی بهره
می‌برد تا تفاوت‌های چگالی را افزایش دهد و تصویر
تقریباً سه بعدی به نظر می‌رسد.

فلوئورنسن. جایگاه مولکول‌های ویژه را در سلول با
نشان دار کردن مولکول‌ها توسط پادتن‌ها و رنگ‌های
فلوئورسنست نشان می‌دهد. این مواد فلوئورسنست، تابش
ماورای بخش را جذب کرده و نور مرئی تابش می‌کنند.
در این سلول رحمی نشان دارشده با فلوئورسنست، DNA.
آبی، میتوکندری‌ها نارنجی و اسکلت سلولی سبز است.




میکروسکوپ الکترونی (EM). میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM). میکروسکوپ الکترونی گذاره، یک بخش نازک از نمونه را نشان می‌دهد. اینجا، ما برشی از یک سلول نای را می‌بینیم. هنگام آماده‌سازی نمونه برای TEM، برخی مزک‌ها در راستای طول‌شان بریده شده و برش‌های طولی را ایجاد می‌کنند، در حالی که مزک‌های دیگر به صورت عرضی بریده شده و بر عرضی را ایجاد می‌نمایند.

میکروسکوپ الکترونی-کربایو (cryo-EM). نمونه‌های بافت یا محلول‌های آبی پروتئینی، به سرعت در دمای‌هایی بین -160°C - -180°C - از پیزندت مولکول‌ها در حالتی بسیار ثابت قرار گیرند. یک پرتوی الکترونی از نمونه عبور داده می‌شود تا مولکول‌ها از طریق میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده شوند، سپس از یک نرم‌افزار برای ظاهر کردن مجموعه‌ای از ریزنگارها استفاده می‌شود تا تصویری سه بعدی، مانند آنچه در پایین دیده می‌شود، حاصل شود. تصویر کامپیوتی از زیم باکتریایی *Глактоциباز* که مسئول تجزیه لاکتوز است، این تصویر از کنار هم قرار گرفته $90,000\times$ تصویر cryo-EM تشکیل شده است.

میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM). ریزنگارهای گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی نگاره، یک تصویر سه بعدی از سطح یک نمونه را نشان می‌دهند. این SEM، سطح یک سلول نای را نشان می‌دهد که با مژک پوشیده شده است. SEM و TEM نشان داده شده در اینجا به طور مصنوعی رنگ‌آمیزی شده‌اند. (ریزنگارهای الکترونی، سیاه و سفید هستند، اما اغلب به طور مصنوعی رنگ‌آمیزی می‌شوند تا ساختارهای خاصی بر جسته شوند.)

مهارت‌های بصیری زمانی که بافت برای مشاهده با TEM برش خوده، جهت مزک‌ها در تصویر بالا سمت چپ چگونه بوده است؟ در تصویر سمت راست چطور؟ توضیح دهید که جهت‌گیری مزک‌ها چگونه نوع مقطع را تعیین می‌کند؟



قادر ساخت تا جزئیات بیشتری را مشاهده کنند. به علاوه، هر دو نوع میکروسکوپ هم کانون و پیچیدگی زدا تصاویر سه بعدی بافت‌ها و سلول‌ها را بسیار دقیق و واضح می‌گیرند. نهایتاً، طی دهه‌های اخیر، مجموعه‌ای از روش‌ها و مولکول‌های نشانه‌گذار جدید به محققان این فرصت را داده‌اند تا موانع موجود در وضوح تصاویر را « بشکنند » و بتوانند ساختارهایی با ابعاد کوچک‌تر از سلول، تا حد ۱۰-۲۰ نانومتر را تشخیص دهند. در نوع جدیدی از TEM که میکروسکوپ الکترونی - کرایو (cryo-EM) نام دارد (شکل ۳ - ۶ را ببینید) نمونه‌ها در دماهایی بسیار پایین نگهداری می‌شوند. بنابراین، نیازی به استفاده از مواد نگهدارنده نیست و به موجب آن مشاهده سلول‌ها در محیط سلولی امکان‌پذیر می‌شود. از این روش به عنوان مکمل روش کریستالوگرافی اشعه X و به منظور بررسی کمپلکس‌های پروتئینی و ساختارهای زیرسلولی مانند ریبوزوم‌ها استفاده می‌شود. از cryo-EM برای مشاهده دقیق برخی پروتئین‌های منفرد استفاده شده است. در سال ۲۰۱۷ جایزه نوبل شیمی به ابداع‌کنندگان این روش ارزشمند، اهدا شد. با جهان‌شمول‌تر شدن روش « میکروسکوپی فوق واضح » ممکن است تصاویری که از سلول‌های زنده خواهیم دید برایمان ترسناک‌تر و مهیج‌تر از تصاویر گرفته‌شده وان لیون هوک در ۳۵۰ سال پیش برای روبرت هوک باشد.

میکروسکوپ‌ها مهم‌ترین ابزارهای سلول‌شناسی، یعنی مطالعه ساختار سلولی هستند. اما توصیف ساده اندامک‌های متتنوع سلولی، عملکرد آنها را آشکار نمی‌کند. از همکاری سلول‌شناسی با بیوشیمی، یعنی مطالعه مولکول‌ها و فرایندهای شیمیایی سلول‌ها (متابولیسم)، دانش زیست‌شناسی سلولی جدید ایجاد شده است.

جزء‌به‌جزء کردن سلول

یکی از روش‌های سودمند برای مطالعه ساختار و عملکرد سلول، جزء به جزء کردن سلولی است، هدف از جزء‌به‌جزء کردن سلولی^۱، جدا کردن سلول‌ها و اندامک‌های اصلی آنها از یکدیگر می‌باشد (شکل ۴ - ۶). ابزار مورد استفاده در جزء‌به‌جزء کردن سلولی، دستگاه سانتریفیوژ است که لوله‌های آزمایش محتوی سلول‌های تخریب شده

پرتو، الکترون‌های سطح نمونه را برمی‌انگیزد و این الکترون‌های ثانوی توسط ابزاری شناسایی می‌شوند که الگوی الکترون‌ها را به یک سیگنال الکترونی در صفحه ویدئو تبدیل می‌کند. درنتیجه، تصویری سه بعدی از سطح نمونه ایجاد می‌شود.

زیست‌شناسان سلولی از میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) به منظور مطالعه ساختار درونی سلول‌ها استفاده می‌کنند (شکل ۳ - ۶). در میکروسکوپ گذاره، پرتو الکترونی از درون بخش بسیار نازکی از نمونه عبور می‌کند، درست مشابه با مسیری که نور در میکروسکوپ نوری از درون یک اسلاید (لام) می‌گذرد. نمونه با اتم‌های فلزات سنگین رنگ‌آمیزی می‌شود که این اتم‌ها به ساختارهای سلولی خاصی متصل می‌شوند، لذا چگالی الکترونی بخش‌هایی از سلول نسبت به سایر قسمت‌ها افزایش می‌یابد. الکترون‌هایی که از نمونه عبور می‌کنند در نواحی با چگالی بیشتر پخش می‌شوند، به طوری که الکترون‌های کمتری از آن ناحیه عبور می‌کنند. تصویر به‌وسیله الکترون‌های عبوریافته ایجاد می‌شود. در میکروسکوپ گذاره و نگاره به جای عدسی شیشه‌ای از آهن‌رباهای الکترونی استفاده می‌شود که مسیر حرکت الکترون‌ها را کج کرده و نهایتاً تصویری را برروی صفحه نمایش یا فیلم عکاسی ایجاد می‌کنند.

میکروسکوپ‌های الکترونی، بسیاری از اندامک‌های سلولی را که به‌وسیله میکروسکوپ نوری قابل مشاهده نبودند شناسایی کردند. ولی میکروسکوپ‌های نوری نسبت به نوع الکترونی مزایایی را دارا هستند، به ویژه اینکه برای مطالعه سلول‌های زنده استفاده می‌شوند. یک عیب میکروسکوپ الکترونی در این است که روش مورد استفاده در تهیه نمونه همراه با از بین بردن و کشتن سلول‌ها است. همچنین آماده‌سازی نمونه با ایجاد بخش‌های ساختمانی زاید همراه است که در تصویر ایجاد شده دیده می‌شود در حالی که در سلول زنده وجود ندارند.

در چندین دهه گذشته، میکروسکوپ‌های نوری توسط دستاوردهای تکنیکی اساسی بهبود یافته‌اند (شکل ۶-۳ را ببینید). نشان‌دار کردن مولکول‌ها یا ساختارهای خاص سلولی به‌وسیله نشان‌گرهای خاص فلورورسانست، محققان را

را با سرعت‌های متفاوت می‌چرخاند. نیروی حاصل از این چرخش، اجزای سلولی را بر حسب اندازه و چگالی از هم جدا می‌کند. در هر سرعتی، نیروی ایجادشده، موجب تنهشین شدن مجموعه‌های از اندامک‌های سلول در ته لوله آزمایش می‌شود و یک برآمدگی تشکیل می‌دهد. در سرعت‌های پائین، اجزای بزرگ‌تر تنهشین می‌شوند و در سرعت‌های بالاتر، ذرات کوچک‌تر قرار می‌گیرند.

جزء‌به‌جزء کردن سلولی، محققین را قادر به تهیه اجزای ویژه سلولی می‌کند. با انجام این تکنیک، زیست‌شناسان توانستند اعمال مختلف سلولی را به اندامک‌های متفاوت درون آن نسبت دهند، کاری که با سلول‌های سالم بسیار مشکل است. به عنوان مثال، یک بخش سلولی جمع‌آوری شده به‌وسیله سانتریفیوژ، دارای آنزیم‌هایی است که در فرایند متابولیسمی تنفس سلولی نقش دارند. میکروسکوپ الکترونی مشخص کرده که این بخش بسیار غنی از میتوکندری است.

این اطلاعات به زیست‌شناسان سلولی کمک می‌کند که تعیین کنند میتوکندری‌ها مکان‌های انجام تنفس سلولی هستند. سلول‌شناسی و بیوشیمی مکمل یکدیگرند، زیرا ساختار و عملکرد سلولی را به یکدیگر مرتبط می‌سازند.

پرسش‌های مبحث ۶-۱

۱- رنگ‌های مورد استفاده برای میکروسکوپ نوری در مقایسه با رنگ‌های استفاده شده در میکروسکوپ الکترونی چگونه هستند؟


۲- **چه می‌شد اگر؟** ▶ چه نوع میکروسکوپی برای مطالعه (الف) تغییرات شکلی در سلول‌های زنده سفید خونی و (ب) جزئیات ساختمانی یک تار مو مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

برای ملاحظه پاسخ‌های پیشنهادی، به ضمیمه A مراجعه کنید.

▼ شکل ۶-۴ روش تحقیق جزء‌به‌جزء کردن سلولی

کاربرد: جزء‌به‌جزء کردن سلولی به منظور جداسازی اجزای سلولی برای ایجاد چگالی و اندازه صورت می‌گیرد.

روش: ابتدا سلول‌ها در یک مخلوط‌کن شکسته شده و مخلوط هموزن حاصله، سانتریفیوژ می‌شود. مایع رویی به لوله دیگری منتقل شده و در سرعت بالاتری برای مدت زمان بیشتری سانتریفیوژ می‌شود. این فرایند چند بار تکرار می‌شود. این «سانتریفیوژ افتراکی» منجر به ایجاد یک سری رسوب می‌شود، که هر کدام محتوی اجزای سلولی متفاوتی هستند.



نتایج: در آزمایش‌های ابتدایی، محققین از میکروسکوپ به منظور شناسایی اندامک‌های موجود در رسوب و از روش‌های بیوشیمیابی برای تعیین اعمال متابولیکی هر کدام از اندامک‌ها استفاده کردند. محققین به طور رایج از جزء‌به‌جزء کردن سلولی برای جدا کردن اندامک‌ها و مطالعه جزئیات عملکرد آنها استفاده می‌کنند.

ارتباط دهید ▶ اگر می‌خواستید فرایند ترجمه mRNA به پروتئین‌ها را مطالعه کنید، از کدام قسمت کدام جزء استفاده می‌کردید؟ (شکل ۵-۲۲ را بینید).

ریبوزوم هستند؛ اندامک‌های ریزی که براساس اطلاعات ژن‌ها کار ساختن پروتئین‌ها را انجام می‌دهند. تفاوت اصلی بین سلول‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی در جایگاه DNA است. کروموزوم‌های یک سلول یوکاریوتی در یک اندامک غشادار به نام هسته قرار دارند. (شکل ۶-۸ را ببینید). کلمه پروکاریوتیک از کلمه یونانی *pro* به معنی پیش و *karyon* به معنی هسته مشتق شده است. در یک سلول پروکاریوتی (شکل ۶-۵)، DNA در ناحیه‌ای به نام نوکلئوئید قرار دارد اما فاقد غشائی است که از بقیه سلول‌جدا شود. در صورتی که سلول یوکاریوتی (یو، eu، واقعی و *karyon*) هسته واقعی دارد که به وسیله پوشش هسته‌ای احاطه شده است.

در سلول‌های یوکاریوتی، ناحیه بین هسته و غشای پلاسمایی را سیتوپلاسم می‌نامند. در پروکاریوت‌ها، این اصطلاح به درون سلول اشاره دارد. درون سیتوپلاسم یک سلول یوکاریوتی، اندامک‌های مختلفی وجود دارند. این ساختارهای احاطه شده با غشا در پروکاریوت‌ها حضور ندارند. بنابراین حضور یا عدم حضور یک هسته واقعی تنها یک مثال از

مبحث 6-2


سلول‌های یوکاریوتی دارای غشاهای داخلی هستند که به کمک این غشاهای اعمال شان را سازماندهی می‌کنند

واحد اصلی ساختاری و عملکردی هر موجود زنده، یکی از دو نوع سلول پروکاریوتی یا یوکاریوتی است. تنها موجودات گروه باکتری‌ها و آرکی آمشکل از سلول‌های پروکاریوتی هستند. آغازین، قارچ‌ها، جانوران و سلول‌های گیاهی همگی از سلول‌های یوکاریوتی تشکیل شده‌اند. (آغازی، یک اصطلاح غیررسمی است که به گروه‌های مختلفی از یوکاریوت‌ها که اغلب تکسلولی هستند بر می‌گردد).

مقایسه سلول‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی

تمامی سلول‌ها دارای چندین ویژگی اصلی و مشترک هستند: آنها همگی به وسیله یک غشا به نام غشای پلاسمایی احاطه شده‌اند. درون سلول، یک ماده شبه سیال به نام سیتوپلاسم وجود دارد که اندامک‌ها در آن شناورند. تمامی سلول‌ها دارای کروموزوم هستند که کار حمل ژن‌ها را به شکل DNA برعهده دارند. همچنین، همه سلول‌ها دارای

▼ **شکل ۶-۵** یک سلول پروکاریوتی. یک سلول پروکاریوتی به خاطر نداشتن هسته و اندامک‌های غشادار موجود در یک سلول یوکاریوتی دارای ساختاری بسیار ساده است. پروکاریوت‌ها شامل باکتری‌ها و آرکی آ هستند. ساختار سلولی کلی این دو قلمرو تقریباً مشابه است.



اندازه میکروسکوپی اغلب سلول‌ها و همچنین شکل باریک و بلند دیگر سلول‌ها مانند سلول‌های عصبی را توجیه می‌کند. موجودات بزرگ‌تر، سلول‌های بزرگ‌تری از موجودات ساده‌تر ندارند، بلکه دارای تعداد سلول‌های بیشتری هستند. (قسمت بالا، سمت راست شکل ۶-۷ را ببینید). نسبت بالای سطح به حجم برای سلول مهم می‌باشد تا میزان زیادی از مواد را با محیطش مبادله کند، درست مثل سلول‌های روده‌ای. چنین سلول‌هایی دارای زوائد بلند و باریکی در سطح خود به نام ریزپرز هستند که نواحی سطحی سلول را بدون افزایش در حجم سلولی افزایش می‌دهند.

ارتباط تکاملی سلول‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی بعداً در همین فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مورد سلول‌های پروکاریوتی در فصل ۲۷ به صورت جزئی و دقیق توضیح داده خواهد شد. اغلب مباحثی که در این فصل درباره ساختار سلول دنبال می‌شوند، مربوط به سلول‌های یوکاریوتی است.

نگاهی دقیق‌تر به سلول یوکاریوتی

یک سلول یوکاریوتی علاوه بر غشای پلاسمایی در بخش بیرونی خود، دارای یک سری غشاهاي داخلی است که سلول را به بخش‌ها و اجزای خاصی تقسیم‌بندی می‌کند. اندامک‌های غشادر که قبلاً ذکر شدند، در متابولیسم سلولی به صورت مستقیم نقش دارند، چرا که بسیاری از آنزیم‌های دخیل در متابولیسم در غشاها قرار دارند. همچنین، بخش‌های درون‌سلولی، محیط‌های متفاوتی را فراهم می‌کنند تا اعمال متابولیکی خاصی را تسريع کنند، به‌گونه‌ای که فرایندهای ناسازگار به طور همزمان در داخل همان سلول انجام می‌شوند. به‌طور کلی، غشاهاي زیستی متشکل از دولایه فسفولیپیدی به همراه لیپیدهای دیگر هستند. پروتئین‌های متنوعی نیز در این غشاها فرو رفته‌اند و یا به سطح این دولایه‌های لیپیدی اتصال یافته‌اند (شکل ۶-۶). اما هر نوع غشا، دارای محتویات منحصر به‌فرد لیپیدی و پروتئینی است که مرتبط با اعمال ویژه غشاهاي هستند. به عنوان مثال آنزیم‌هایی فرورفت‌ه در غشاها میتوکندری در تنفس سلولی نقش دارند. غشاها برای سازماندهی سلول‌ها ضروری هستند، بنابراین در فصل ۷ با جزئیات به آنها پرداخته شده است.

قبل از ادامه دادن این فصل لازم است مروری بر

اختلاف ساختمانی پیچیده بین این دو نوع سلول است. سیتوپلاسم در پروکاریوت‌ها، با اینکه فاقد اندامک است، اما مانند یک سوب بدون شکل نیست. به عنوان مثال، برخی پروکاریوت‌ها دارای مناطقی هستند که با پروتئین‌هایی محصور شده‌اند (منظور غشانیست)، در این مناطق واکنش‌های خاصی اتفاق می‌افتد.


سلول‌های یوکاریوتی عموماً بسیار بزرگ‌تر از سلول‌های پروکاریوتی هستند (شکل ۶-۲). اندازه، یک جنبه عمومی از ساختمان سلولی است که در ارتباط با عملکرد سلول است. منطق انجام متابولیسم سلولی باعث ایجاد یکسری محدودیت‌ها در اندازه سلولی می‌گردد. در محدوده‌های پایین تراز کوچک‌ترین سلول‌ها، که باکتری‌ها هستند، مایکوپلاسما قرار دارند که دارای قطری بین $1/\text{۰}$ و 1 میکرومتر هستند. این‌ها شاید کوچک‌ترین ساختارهایی باشند که برای برنامه‌ریزی متابولیسم خود، DNA کافی دارند و آنزیم‌ها و ابزارهای سلولی لازم برای انجام فعالیت‌هایی که برای بقا و تولید مثل یک سلول ضروری است را در اختیار دارند. اکثر باکتری‌ها دارای قطر $1\text{ تا }5\text{ میکرومتر}$ هستند، ابعادی ده برابر مایکوپلاسماها. سلول‌های یوکاریوتی عموماً دارای قطر $1\text{ تا }10\text{ میکرومتر}$ هستند.

نیازهای متابولیکی، حداکثر اندازه‌ای که یک سلول منفرد می‌تواند داشته باشد را تعیین می‌کند. در مرز هر سلول، غشای پلاسمایی به عنوان یک سد انتخابی عمل می‌کند که اجازه عبور اکسیژن، مواد غذایی و مواد زائد را می‌دهد (شکل ۶-۶). برای هر میکرومتر مربع از غشا، تنها مقداری از یک ماده خاص در ثانیه می‌تواند عبور کند بنابراین نسبت سطح به حجم در سلول مهم است. همان‌طور که اندازه سلول افزایش می‌یابد، حجمش به تناسب، بیش از مساحتش افزایش می‌یابد. بنابراین هرچه حجم جسم کوچک‌تر باشد نسبت سطح به حجمش بزرگ‌تر خواهد بود (شکل ۶-۷). تمرین مهارت‌های علمی این امکان و فرصت را به شما می‌دهد که حجم و سطح دو سلول واقعی را محاسبه کنید. یکی، سلول مخمر بالغ و دیگری سلولی که از آن جوانه زده است. برای اینکه روش‌های مختلف ارگانیسم‌هایی (موجودات زنده) که سطح سلولی خود را افزایش می‌دهند ببینید، ارتباط دهید شکل ۳۳-۸ را ببینید.

نیاز به وجود یک سطح که به تناسب حجم بزرگ باشد،


سلول‌های جانوری و گیاهی را به تصویر می‌کشند. ریزنگار موجود در پایین شکل، شما می‌کلی از سلول‌ها در موجودات زنده مختلف را نشان می‌دهد.

سلول‌های یوکاریوتی در شکل ۶-۶ داشته باشید. تصاویر کلی از یک سلول جانوری و یک سلول گیاهی، اندامک‌های متفاوتی را نشان می‌دهند و تفاوت‌های عمده میان



مهارت‌های بصری ◀ کدام بخش از شکل غشا در (b) با قسمت سیاه ارتباط دارد؟ کدام بخش در شکل (a) با قسمت سفید ارتباط دارد. (شکل ۵-۱۱ را مرور کنید)

◀ **شکل ۶-۶ غشای پلاسمایی.** غشای پلاسمایی و غشاهای اندامک‌ها شامل دو لایه لیپیدی از فسفولیپیدها همراه با پروتئین‌های مختلف متصل شده یا فرو رفته در آن هستند. دنباله فسفولیپیدی در بخش داخلی یک غشا آب‌گردی است و بخش درونی پروتئین‌های خارجی و زنجیره‌های کربوهیدراتی سر فسفولیپیدی، پروتئین‌های خارجی و زنجیره‌های کربوهیدراتی همگی آب‌دوست هستند و در تماس با محلول آبی می‌باشند. زنجیره‌های کربوهیدراتی تنها در بخش بیرونی غشای پلاسمایی دیده می‌شوند.



◀ **شکل ۶-۷ روابط هندسی بین مساحت و حجم.** در این نمودار، سلول‌ها به شکل جعبه‌هایی نشان داده شده‌اند. به کمک واحدهای اختیاری طول می‌توان مساحت را بر حسب واحد مربع و حجم را بر حسب واحد مکعب و نیز نسبت سطح به حجم را محاسبه کرد. نسبت بالای سطح به حجم، تبادل مواد را بین یک سلول و محیطش تسهیل می‌کند.


Total surface area [(height × width of 1 side) × 6 sides × number of cells]	6 units ²	150 units ²	750 units ²
Total volume [(height × width × length of 1 cell) × number of cells]	1 unit ³	125 units ³	125 units ³
Surface area-to- volume ratio [surface area ÷ volume]	6	1.2	6

تمرین مهارت‌های علمی

تفسیر داده‌ها:

- ۱-** ریزنگار سلول‌های مخمر را بررسی کنید. مقیاس تعیین‌شده روی شکل، $1\text{ }\mu\text{m}$ را نشان می‌دهد. این مقیاس درست مانند مقیاس‌های $1/6$ روی نقشه عمل می‌کند که در آنها، $2/54$ سانتی‌متر معادل کیلومتر است. در اینجا مقیاس معادل یک هزارم یک میلی‌متر است. با استفاده از مقیاس تعیین‌شده به عنوان واحد پایه، قطر سلول والد بالغ و سلول جدید را تعیین کنید. با اندازه‌گیری مقیاس و قطر هر سلول (با خطکش) شروع کنید. مهم نیست که از چه واحدی استفاده می‌کنید اما استفاده از میلی‌متر راحت‌تر است. اندازه قطرهای بددست آمده را به طول مقیاس تعیین‌شده ضرب کنید تا قطر سلول‌ها با مقیاس میکرومتر بددست آید.
- ۲-** شکل سلول‌های مخمر تقریباً کروی است. (a) حجم هر سلول را با استفاده از فرمول حجم کره محاسبه کنید:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



- توجه کنید که π (حروف یونانی پی) یک ثابت، با ارزش تقریبی $3/14$ است. d ، نماینده قطر و r به مفهوم شعاع است که نصف قطر است. (b) سلول جدید در حین بالغ شدن می‌باشد که حجمی از سیتوپلاسم جدید را بسازد؟ برای تعیین این موضوع، تفاوت حجم میان سلول بزرگ و سلول جدید را محاسبه کنید.

- ۳-** غشای پلاسمایی سلول جدید برای اینکه بتواند حجم سیتوپلاسم جدید را در برگیرد می‌باشد گسترش یابد.

- (a) سطح هر سلول را با استفاده از فرمول سطح کره محاسبه کنید:
- $$A = 4\pi r^2$$

- (b) در حین بالغ شدن، سلول جدید چه مقدار غشای پلاسمایی را می‌باشد بسازد

- ۴-** وقتی که سلول جدید بالغ شده حجم و سطح آن چند برابر اندازه فعلی آن خواهد بود؟


استفاده از مقیاس تعیین‌شده روی تصاویر برای محاسبه سطح و حجم یک سلول

یک سلول مخمر در حال رشد، چه مقدار سیتوپلاسم و غشای پلاسمایی می‌سازد؟

مخمر تکسلولی ساکارومایزر سرویزیه از طریق جوانه زدن یک سلول جدید کوچک که بعداً رشد کرده و تبدیل به یک سلول بزرگ می‌شود، تقسیم می‌شود (در پایین شکل ۶-۸ سلول‌های مخمر را مشاهده کنید). سلول جدید در زمان رشد، سیتوپلاسم جدید تولید می‌کند که موجب افزایش حجم آن می‌شود و همچنین غشای پلاسمایی جدید تولید می‌کند که به افزایش سطح آن می‌انجامد در این تمرین، با استفاده از مقیاس تعیین‌شده روی شکل اندازه یک سلول مخمر والدی و سلولی که در حال جوانه زدن از آن است را تعیین خواهید کرد. از محاسبات خود برای تعیین میزان سیتوپلاسم و غشای پلاسمایی که سلول جدیدی می‌باشد تولید کند تا به سلول بزرگ تبدیل شود استفاده خواهید کرد.


چگونگی انجام آزمایش: سلول‌های مخمر تحت شرایطی که تقسیم از طریق جوانه زدن را افزایش می‌داد، رشد کردند. سپس سلول‌ها توسط میکروسکوپ نوری کنتراست تداخلی - افتراقی مشاهده و عکسبرداری شدند.

داده‌های آزمایش: این ریزنگار نوری، یک مخمر در حال جوانه زدن را که تقریباً از سلول بالغ والدی رها می‌شود، نشان می‌دهد.




▼ شکل ۸-۸ بررسی سلول‌های بیکاربودی


چشم‌اندازی کلی از یک سلول جانوری




سلول‌های جانوری







سلول‌های قارچی




سلول‌های مخمر: در حال تولید ممثل از طریق جوانهدن (بالا، SEM رنگی) و یک سلول منفرد (راست TEM رنگی)





حدود ۱۰۰ نانومتر وجود دارد. در دهانهٔ هر منفذ، غشاهای داخلی و خارجی پوشش هسته‌ای در امتداد یکدیگر و به صورت پیوسته هستند. یک پروتئین ساختمانی پیچیده به نام مجموعهٔ (کمپلکس) منفذی در هر منفذ قرار دارد و ورود و خروج پروتئین‌ها و RNA‌ها و نیز کمپلکس‌های درشت‌مولکولی را تنظیم می‌کند. به‌غیر از ناحیهٔ منفذ، سمت هسته‌ای پوشش به‌وسیلهٔ لامینای هسته‌ای پوشیده شده است. لامینای هسته‌ای آرایشی شبکه‌مانند از رشته‌های پروتئینی است که شکل هسته را با حمایت کردن از پوشش هسته‌ای حفظ می‌کند. مدارک زیادی نیز برای ماتریکس هسته‌ای وجود دارد که مجموعه‌ای از رشته‌های امتدادیافته در سرتاسر بخش داخلی هسته است. لامینای هسته‌ای و ماتریکس به سازمان‌دهی مادهٔ ژنتیکی و نیز عملکرد بهتر آن کمک می‌کنند.

در درون هسته، DNA به صورت واحدهای مجزایی به نام کروموزوم‌ها - ساختارهای محتوی اطلاعات ژنتیکی - وجود دارد. هر کروموزوم متشکل از یک مولکول DNA طویل به همراه تعداد زیادی پروتئین است. یکی از این پروتئین‌ها، پروتئین ساده و کوچک هیستون است. برخی پروتئین‌ها به پیچ خوردن مولکول DNA هر کروموزوم کمک می‌کنند تا طول آن کاهش یابد و درون هسته جای گیرد. وقتی سلول در حال تقسیم نیست، کروماتین رنگ‌آمیزی شده به صورت یک توده درهم پیچیده قابل مشاهده است. وقتی یک سلول برای تقسیم سلولی آماده می‌شود، رشته‌های کروماتین نازک به دور هم می‌پیچند و متراکم و به اندازهٔ کافی ضخیم می‌شوند تا به صورت ساختمانهای رشته‌ای مجزا، یعنی همان کروموزوم درآیند (شکل ۶-۲۳ را ببینید). هرگونهٔ یوکاریوتی دارای تعدادی مشخص از کروموزوم‌ها در هسته خود است. به عنوان مثال، یک سلول انسان ۴۶ کروموزوم در هسته‌اش دارد، البته به‌غیر از سلول‌های جنسی (اسپرم‌ها و تخمرک) که دارای ۲۳ کروموزوم هستند. یک مکس سرکه دارای ۸ کروموزوم در اکثر



پرسش‌های مبحث ۶-۲

۱- پس از مرور کامل شکل ۶-۸، به‌طور خلاصه ساختمان و عملکرد هسته، میتوکندری، کلروپلاست، واکوئل، شبکهٔ آندوبلاسمی و دستگاه گلزی را توصیف کنید.

۲- **چه می‌شد اگر؟** یک سلول دراز (مثل یک سلول عصبی) به ابعاد $125 \times 1 \times 1$ (واحد اختیاری) تصور کنید. پیشگویی کنید که چگونه نسبت سطح به حجم این سلول با آنچه در شکل ۶-۷ می‌بینید مقایسه می‌شود. سپس نسبت سطح به حجم را محاسبه کرده و پیشگویی خود را بررسی کنید.

برای ملاحظهٔ پاسخ‌های پیشنهادی، به ضمیمهٔ A مراجعه کنید.

مبحث ۶-۳

اطلاعات و دستورات ژنتیکی سلول‌های یوکاریوتی در هسته قرار دارند و به‌وسیلهٔ ریبوزوم‌ها به مرحلهٔ عمل درمی‌آیند در اولین توقف ماهنگام بررسی جزئیات سلولی، اجازه بدھید که به دو اندامک درگیر در کنترل ژنتیکی سلول نگاهی بیندازیم: هسته که جایگاه و خانهٔ DNA سلولی است و ریبوزوم‌ها که از اطلاعات DNA به‌منظور سنتز پروتئین‌ها استفاده می‌کنند.

هسته: کتابخانهٔ ژنتیکی سلول

هسته در برگیرندهٔ بیشتر ژن‌های سلول یوکاریوتی است (برخی ژن‌ها در کلروپلاست‌ها و میتوکندری‌ها قرار دارند).

هسته، مشخص‌ترین اندامک سلول‌های یوکاریوتی است (ساختار بنفش‌رنگ در عکس فلورئنسنس را مشاهده کنید) که قطر آن به‌طور میانگین حدود ۵ میکرومتر است. پوشش هسته‌ای، دور هسته را احاطه می‌کند (شکل ۶-۹) و محتویاتش را از سیتوپلاسم جدا می‌سازد. پوشش هسته‌ای یک غشای دوتایی است. دو غشا هر کدام به صورت دو لایهٔ لیپیدی هستند و پروتئین‌ها با فاصلهٔ ۲۰ تا ۴۰ نانومتر نسبت به یکدیگر بر روی این غشاهای قرار گرفته‌اند. در پوشش هسته منافذی با قطري

انجام می‌دهند. ریبوزوم‌های آزاد در سیتوزول معلق هستند، در حالی که ریبوزوم‌های دیگر به بخش بیرونی شبکه آندوپلاسمی یا پوشش هسته‌ای متصل‌اند (شکل ۶-۱۰ را ببینید). ریبوزوم‌های متصل و آزاد از نظر ساختاری مشابه هستند و می‌توانند در زمان‌های مختلف در هر دو نقش ظاهر شوند. اکثر پروتئین‌های ساخته‌شده از ریبوزوم‌های آزاد، عمل‌شان را در داخل سیتوزول انجام می‌دهند، به عنوان مثال آنزیم‌های تسریع‌کننده مراحل اولیه شکستن قند از این دسته هستند. ریبوزوم‌های متصل، سنتز پروتئین‌هایی را انجام می‌دهند که یا باید در بخش غشایی قرار گیرند و یا به صورت بسته‌بندی‌شده به اندامک‌هایی همچون لیزوزوم‌ها منتقال یابند (شکل ۶-۸)، و یا به صورت ترشحی از سلول به خارج فرستاده شوند. سلول‌هایی که برای عمل ترشح تخصص یافته‌اند، مثل سلول‌های لوزالمعده که آنزیم‌های گوارشی را ترشح می‌کنند، اغلب دارای نسبت بالایی از ریبوزوم‌های متصل هستند. در فصل ۱۷ در مورد ساختمان و عملکرد ریبوزوم‌ها بیشتر خواهد آموخت.

پرسش‌های مبحث ۶-۳

- ۱- ریبوزوم‌ها چه نقشی را در تحقق بخشیدن به اطلاعات ژنتیکی بر عهده دارند؟
- ۲- اجزای مولکولی هستک را به همراه اعمال هر کدام از آنها توصیف کنید.
- ۳- **چه می‌شد اگر؟** به محض اینکه سلول مراحل تقسیم را آغاز کند، کروماتین فشرده و فشرده‌تر می‌شود. آیا طی این فرایند تعداد کروموزوم‌ها تغییر می‌کند؟ توضیح دهید.

برای ملاحظه پاسخ‌های پیشنهادی، به ضمیمه A مراجعه کنید.

سلول‌هاییش است و در سلول‌های جنسی اش ۴ کروموزوم دارد. در هسته‌ای که در حال تقسیم نیست یک ساختار برجسته به نام هستک وجود دارد که در ریزنگار الکترونی به صورت توده‌ای از دانه‌های رنگ‌آمیزی‌شده و متراکم و رشته‌هایی که به کروماتین تبدیل می‌شوند دیده می‌شود. در هستک یک نوع RNA خاص به نام rRNA ریبوزومی (rRNA) از اطلاعات DNA هستک ساخته می‌شود. همچنین pRNA در کنار rRNA پروتئین‌های ساخته‌شده در سیتوپلاسم با قرار گرفته و به صورت زیرواحدهای ریبوزومی کوچک و بزرگ در هستک درمی‌آیند. این زیرواحدهای سپس به واسطه منافذ هسته‌ای به سیتوپلاسم منتقال یافته و در آنجا زیرواحدهای کوچک و بزرگ ریبوزوم به هم متصل شده و تشکیل یک ریبوزوم کامل را می‌دهند. گاهی اوقات دو یا چند هستک در سلول وجود دارند که تعداد آنها به گونه و مراحل چرخه تولیدمثلى آن گونه بستگی دارد. هستک ممکن است در کنترل تقسیم سلول و طول عمر آن نقش داشته باشد.

همان‌طور که در شکل ۶-۵ مشاهده کردیم، هسته با ساختن RNA پیک (mRNA) براساس اطلاعات DNA از طریق منافذ هسته‌ای به سیتوپلاسم منتقال داده می‌شود. وقتی RNA پیک به سیتوپلاسم می‌رسد، ریبوزوم‌ها پیام ژنتیکی این RNA را به شکل یک پلی‌پیتید و پژه ترجمه می‌کنند. فرایند رونویسی و ترجمه اطلاعات ژنتیکی در فصل ۱۷ مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ریبوزوم‌ها: کارخانه‌های پروتئین‌سازی

ریبوزوم‌ها که از RNA ریبوزومی و پروتئین ساخته شده‌اند، اجزای سازنده پروتئین هستند (شکل ۶-۱۰) (توجه داشته باشید که ریبوزوم‌ها غشادار نبوده و اندامک به شمار نمی‌آیند). سلول‌هایی که سرعت بالایی در سنتز پروتئین دارند دارای تعداد بیشتری ریبوزوم و بالطبع هستک‌های فعال و برجسته هستند (هستک در سرهنگی ریبوزوم‌ها نقش دارد). به عنوان مثال، سلول‌های پانکراس انسان که آنزیم‌های گوارشی بسیاری را می‌سازند، دارای چندین میلیون ریبوزوم هستند. ریبوزوم‌ها کار ساختن پروتئین را در دو جایگاه سیتوپلاسمی

◀ شکل ۶-۹ هسته و پوشش آن. کروموزوم‌ها درون هسته قرار دارند و به صورت توده‌ای از کروماتین (DNA و پروتئین‌های همراهش) و یک یا چند هستک که در کار سنتز ریبوزوم نقش دارند دیده می‌شوند. پوشش هسته‌ای که شامل دو غشای جدا شده به وسیله یک فضای باریک می‌باشد، دارای منافذی است و توسط لامینای هسته‌ای پوشیده می‌شود.



◀ شکل ۶-۱۰ ریبوzوم‌ها ریزنگار الکترونی از بخشی از پانکراس که در آن بسیاری از ریبوzوم‌ها هم به صورت آزاد (در سیتزوول) و هم به صورت متصل (به شبکه آندوبلاسمی) مشخص هستند. دیگرام ساده شده آن، یک ریبوzوم را به همراه دو زیراحدش نشان می‌دهد. رسم کنید ▶ بعد از مطالعه بخش ریبوzوم، در ریزنگار، دور ریبوzومی که ممکن است در ساخت پروتئین ترجمه دخیل باشد را خط بکشید.

